



Stalvlieg

Latijns:	Stomoxys Calcitrans
Familie:	Vliegen
Orde:	Tweevleugelingen
Status:	Niet beschermd



Uiterlijk en kenmerken

Een volgroeide stalvlieg is ca. 7-8 mm lang. Hij is sterk te vergelijken met de kamervlieg, maar deze soort heeft een duidelijk naar voren gerichte steeksnuit en een korter en breder achterlijf. De bovenzijde van het achterlijf vertoont een dambordpatroon en er komen vier horizontale strepen voor op het borststuk. Stalvliegen staan vooral bekend als agressieve bijters en bloedzuigers.

Ontwikkeling en leefwijze

Stalvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). De ontwikkelingsduur kan sterk variëren:

- Bij 19 graden, ca. 1 maand
- Bij 33 graden, ca. 10 dagen

Het wijfje legt in rottend organisch materiaal, waarbij één vrouwtje tot ca. 50 eitjes per dag legt. De uit het ei gekomen larven, ook wel maden genoemd, ontwikkelen zich in het organische materiaal. Volwassen dieren vliegen uit van juni tot oktober en zijn warmteminnend.

Stalvliegen leven van bloed en steken bij mens en dier. De steek kan pijnlijk zijn. De vliegen steken bij voorkeur de lagere lichaamsdelen. Iedere individuele vlieg voedt zich ca. 1-2 keer per dag gedurende ca. 15 minuten.

Schuilplaatsen

De stalvlieg komt voor in de buurt van boerderijen, kalver- en paardenstallen. De stalvlieg zitten vaak op/in hagen, begroeiing en op zonnige muren in de buurt van vee.

Mogelijke risico's, schade of hinder

- **Verminderde melk- en vleesopbrengst in de veehouderij bij grote aantallen stalvliegen**

- **Verstoring van rust bij vee**
- **Overdracht van ziektekiemen (als tussengastheer)**

Wering

- Voorkom, waar mogelijk, langdurige opslag van plantaardig materiaal.
- Dek mest- en composthopen af. Hierdoor ontstaat een te hoge temperatuur dat de ontwikkeling van larven tegen.
- Mest bij voorkeur droog houden.

Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een schoonmaakplan op.

Bestrijding

- Ontnemen van broedplaatsen
- Indien noodzakelijk, kunt u eventuele rustplaatsen laten behandelen met insecticide en/of het aanbrengen van madendood op mest door ten Dijk Ongediertebestrijding.