

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

- a) middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en pluimvee
- b) middel ter bestrijding van larven van (tijger-)muggen in water en gel, waarin Lucky Bamboo stammen staan of komen te staan. Voor deze toepassing geldt dat het middel uitsluitend mag worden gebruikt op de volgende locaties waarvan door het Ctgb is vastgesteld dat wordt voldaan aan milieunormen:

Bedrijf	Locatie	Restrictie
Triple green B.V.	Noordammerweg 85, 1185 ZS, Amstelveen	verontreinigde voedingsoplossing dient te worden geloosd op de riolering met een maximum van 4,90 m ³ /dag
Edelcactus B.V.	Noordammerweg 95, 1187 ZS, Amstelveen	verontreinigde voedingsoplossing dient te worden geloosd op de riolering met een maximum van 1,85 m ³ /dag
Oriental online	Anjerweg 10, 2665 LN, Bleiswijk	-
Go-Get BV	Aalsmeerderweg 377a, 1432 EB Aalsmeer	-
Victor Trading	Laan van de Heilige Lambertus 64, 2691 MV, 's-Gravenzande	-

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

DIMILIN Spuitpoeder 25% is werkzaam tegen de larvale stadia van verschillende insectensoorten. In een aantal gevallen voorkomt het middel ook het uitkomen van de eieren. Het middel heeft een trage aanvangswerking. Om schade te voorkomen is daarom een tijdige toepassing gewenst, dat wil zeggen op eieren of jonge larven.

a. Verblijfplaatsen van rundvee (inclusief melkvee), varkens en pluimvee

ter bestrijding van vliegenlarven (*Musca domestica*, *Fannia canicularis* en *Stomoxys calcitrans*).

Toepassen op plaatsen waar verse mest ligt en op mest in kelders.

<u>Dosering:</u>	- in gesloten stallen:	20 g per 10 m ² ;
	- in open stallen:	40 g per 10 m ² ;
	- in pluimveestallen met snelle mestophoping:	10 g per 10 m ² ;

Opmerkingen:

- Aangezien het middel alleen werkzaam is tegen vliegenlarven, dienen voor een directe bestrijding van eventueel aanwezige volwassen vliegen andere toegelaten middelen te worden gebruikt.
- Doorgaans dient de toepassing om de 5 á 6 weken te worden herhaald. In pluimveestallen met snelle mestophoping worden kortere intervallen aanbevolen (2 weken).

Het middel toepassen in 2-5 liter water per 10 m².

b. Water en gel voor Lucky Bamboo stammen

ter bestrijding van larven van (tijger-)muggen in water of gel waarin Lucky Bamboo stammen staan of komen te staan.

Dosering: Maak eerst een geconcentreerde oplossing van het middel (0,5 g/L). Voeg dit concentraat toe aan het voedingsoplossing of de gel voor de Lucky Bamboo (2 ml concentraat/L water of 2 L concentraat/m³ voedingsoplossing). De uiteindelijke gebruikconcentratie is dan 1 mg middel/L voedingsoplossing.