



WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 DIMILIN granulaat 4%, 7677N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van varkens, pluimvee, mestkalveren en rundvee. Uitsluitend toepassen in afgesloten stallen op plekken niet toegankelijk voor vogels en (huis)dieren.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:

- personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
- personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
- agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Diflubenzuron is een nieuw type insecticide, dat inwerkt op het vervellingsmechanisme. Hierdoor worden alleen larvale stadia van vliegen bestreden. Bestrijding van vliegenlarven vindt plaats door de broedplaatsen met het granulaat te behandelen. Dit zijn voornamelijk die plaatsen, waar vochtige mest en voerresten zich verzamelen.

Omdat DIMILIN Granulaat 4% alleen de larven doodt, kan het ongeveer 2 á 3 weken duren, voordat het aantal aanwezige vliegen belangrijk vermindert. Daarom wordt de beste bestrijding verkregen als het granulaat elke 5 á 6 weken voorbehoedend wordt toegepast.

Als dit voorbehoedend systeem niet wordt gevolgd, dient men in ieder geval een herbehandeling uit te voeren als de vliegenbezetting begint toe te nemen.

Varkensstallen

Het product moet gestrooid worden over de roosters, mesthoeken, mestgangen, in kieren en vooral ook onder langs de randen van hokken. Tevens dient gestrooid te worden rondom voer- en drinkbakken. Voor een goed resultaat is het gewenst alle hokken in een afdeling gelijktijdig te behandelen. Vóór de behandeling eerst de verse mest verwijderen.

Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak.

Gebruikelijke dosering kraamhokken: gemiddeld wordt per hok 4 m² oppervlak behandeld, hiervoor is 50 gram granulaat nodig.

Pluimveestallen

DIMILIN Granulaat 4 % toepassen in stallen met bedrijfsmestputten. De granules over de drijfmest strooien.

Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak.



Mestkalveren

Het product onder boxen en over de mestgoten strooien.

Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak.

Rundveestallen

Roosters, vloeren en randen waar voer- en mestresten aanwezig zijn, met het product behandelen.

Dosering: In gesloten rundveestallen 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak.

In loop- en ligboxenstallen 25 gram per m² te behandelen oppervlak